Elsner pac Vertriebsgesellschaft mbH **Kipsdorfer Str. 146**
Tel.: 0351/ 255 91 0 **D - 01279 Dresden**
Fax: 0351/ 251 74 94 E-Mail: info@pac-elsner.com

Hinweise zur Kulturführung von Sutera cordata

Steckbrief: Hervorragend geeignet in Kombination mit allen Beet- und Balkonpflanzen. Verbrauchertipp:. Zu beachten ist, dass zeitweilige Ballentrockenheit von Sutera allgemein schlecht vertragen wird.

Topfen: 10-12 cm Topf; 50-30 Pfl./m²; KW 4 – 10
15-25 cm Ampel (3-4 Pfl.); 20-12 Stk./m²; KW 1-6

Substrat: einfaches Substrat Typ 2
pH 5-6

Düngung: mittelstark zehrend, 1-2x wöchentlich 0,075-0,2% eines Volldüngers
Während der Kultur sollte auf Eisenmangel Symptome geachtet werden. Diese können problemlos mit Handelsüblichen Eisenchelat-Düngern behoben werden.

Temperatur: anfangs 16-18°C, bei 12-16°C fertig kultivieren
Cool Morning und Dif verbessern die die Qualität und den Pflanzenaufbau. Eine Kaltkultur ist möglich, birgt aber die starke Gefahr von Botrytis und verlängert die Kulturzeit.

Licht: volles licht, unschattiert

Blüte: je nach Lichtverhältnissen ab Anfang April

Wachstumsregulatoren:
Der Einsatz von Wachstumregulatoren verbessern die Qualität.
z.B. mit Regalis 0,25% oder Topflor 0,05%

Pinzieren: 1-2 Wochen nach dem Topfen oder bei geeigneter Jungpflanzengröße sofort. Weiteres Stutzen bzw. Formieren ist empfehlenswert um einen besseren Pflanzenaufbau herbeizuführen.

Krankheiten / Schädlinge:
Botrytis, Thripse, Weiße Fliegen; Hygienemaßnahmen beachten!

Wichtig ist der Wasserhaushalt, die Pflanzen dürfen nicht zu nass stehen, Gefahr von Botrytis, Wurzelschäden und ein unharmonischer Pflanzenaufbau sind die Folge.

Diese Kulturanleitung ist eine Empfehlung. Sie ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden.
Wir bitten um Ihr Verständnis, keine Erfolgsgarantie gewähren zu können, da wir keinen Einfluss auf die Kulturbedingungen in den einzelnen Betrieben haben.
Bitte beachten Sie die jeweils aktuelle Zulassungssituation für Pflanzenschutzmittel.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.