

Hinweise zur Kulturführung von *Ageratum houstonianum*

Leberbalsam

- Steckbrief:** Schöne, reich blühende und kompakte Pflanze für die Beetbepflanzung (besonders auf Friedhöfen), bei einer Pflanzdichte von 30-35 Pflanzen/m². Hierzu frühestens in der zweiten Maihälfte auspflanzen, da kälteempfindlich. Auch für gemischte Balkon- und Kübelbepflanzungen geeignet, aber dann möglichst in Kombination mit weniger konkurrenzstarken Partnerpflanzen. Blüte Mai-August.
- Topfen:** 10 bis 12cm; KW 8-12
- Substrat:** ein lockeres, durchlässiges und Salzarmes Substrat (mit Perlit, Spälz oder Styro Zuschlügen) ist empfehlenswert
pH ca 5,5
- Düngung:** mittelstark zehrend, 1x wöchentlich; 0,15-0,25% mit einem ausgeglichenem Mehrnährstoffdüngers , es sollten keine stark Stickstoffbetonte Dünger verwendet werden
- Temperatur:** bis zur 4 Woche nach dem topfen 14-16°C bei 10-14°C fertig kultivieren
- Licht:** Volles Licht, unschattiert kultivieren. Verfrühung möglich durch Zusatzbelichtung: auf 14 Std. TL
- Blüte:** je nach Lichtverhältnissen ab Ende April
(sofern kein Zusatzlicht genutzt wird)
- Wachstumsregulatoren:**
max. 2x; Cycocel 720 0,15 bis 0,2%
- Pinzieren** Ein Pinzieren ist nicht zwingend notwendig. Sollte jedoch die Verzweigung ungenügend sein, ist ein vereinzelt Stutzen bzw. Formieren empfehlenswert um einen besseren Pflanzenaufbau herbeizuführen.
- Krankheiten / Schädlinge:**
besonders Botrytis, Pythium, Trauermücken, Weiße Fliege, Blattläuse, Spinnmilben, Thripse; Vorbeugende Maßnahmen sind empfehlenswert
- Wichtig ist der Wasserhaushalt, die Pflanzen dürfen nicht zu nass stehen, Gefahr von Botrytis, Wurzelschäden und ein unharmonischer Pflanzenaufbau sind die Folge.