

Hinweise zur Kulturführung von pac® Sorten der Pelargonium peltatum Pelargonium zonale

- Steckbrief:** Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an innovativen Sorten. Sie können unsere Sorten nach Wuchs und oder Farbe kombinieren. In unserem Programm finden Sie auch besondere Serien und trendy Farben.
- Topfen:** KW 50 bis 10 Endabstand: 20-25 Pflanzen/m²
Peltaten 10-11 cm Topf
Zonale 12-13 cm Topf (Sorten der Serie Little Lady® in 8 – 11 cm Topf)
- Substrat:** lockeres, durchlässiges Substrat (mit erhöhtem Weißtorfanteil)
z.B.: Einheitserden Typ 2 (Typ T) oder Eigenmischungen mit Kompostanteil
- N: 150 - 250 mg/l
P: 130 - 200 mg/l
K: 300 - 350 mg/l
pH: 5,8 - 6,0
EC: 1,0 - 1,2 mS
- Düngung:** Flüssigdüngung ständig mit 1g/l, oder 1-2x wöchentlich max. 2,5g/l
- Temperatur:** wichtig ist für eine gute Qualität, dass die Temperaturen an das jeweilige Licht angepasst werden
z.B. ersten 3 Woche ca. 16-18°C
Eine Veränderung der Temperatur je nach Entwicklung der Pflanze wird empfohlen. Dadurch ist eine einfache Wuchsregulation möglich.
- Licht:** junge Pflanzenbestände sollten ab 65 klux schattiert werden
- Blüte:** je nach Lichtverhältnissen (sofern kein Zusatzlicht genutzt wird)
ca. 8-10 Wochen nach Topfen
- Wachstumsregulatoren:**
je nach Entwicklung ist ein Hemmen der Pflanzen empfehlenswert mit Cycocel 720 0,1 bis 0,2%, zu hohe Konzentrationen können besonders an Peltaten Chlorosen an den Blatträndern auslösen die sich aber wieder auswachsen
- Pinzieren:** alle Peltaten der Ville/Decora und Happy Face® -Serie sollten ca. 2 Wochen nach dem Topfen 1x entspitzt werden, bei unseren Zonale Sorten ist dies nicht notwendig
- Krankheiten / Schädlinge:**
Botrytis, Rost, Blattläuse
- Wichtig ist der Wasserhaushalt, die Pflanzen dürfen nicht zu nass stehen, Gefahr von Botrytis, Wurzelschäden und ein unharmonischer Pflanzenaufbau sind die Folge.