

Technical advice

Cleome ARANA

Description:

Our Arana are selectively bred, vegetatively propagated cleomes that have fewer thorns and no sticky leaves. The orchid-like flowers add a touch of exotic. With Arana, we have the leading range in our programme.

Topfen:

Topfen zwischen KW 12 - 15
Topf T12 - T14

Verkauf:

- Ab Anfang Juni

Substrat:

- T-Substrat
- pH 5,5 – 6,5

Düngung:

Mittlerer Nährstoffbedarf: bei kontinuierlicher Bewässerungsdüngung 0,05 % bis 0,08 % bzw. wöchentliche Flüssigdüngung mit 0,1 % bis 0,2 %.

Temperatur:

Mittlerer Wärmebedarf; nach der Einwurzelung bei TMT 18°C empfiehlt sich die Weiterkultur bei TMT 16°C.

Abweichungen sind bei entsprechenden Kulturmaßnahmen möglich.

Licht:

Unter mitteleuropäischen Bedingungen nach der Einwurzelungszeit bei vollem Licht kultivieren.

Blüte:

Ab Juni.

Wachstumsregulatoren:

Bonzi und Alar empfohlen

Stutzen:

Direkt nach Einwurzelung, sowie nach 6 Wochen ein zweites Mal.

Krankheiten/Schädlinge:

Anfällig Blattläuse, Thrips und Spinnmilben. Auf Echten Mehltau achten.

Flächenbelegung:

30 - 35 Töpfe / qm