



Kulturempfehlung

Begonia (boliviensis)

pac® *SUNBRERO*®

Steckbrief:

In dieser Serie haben wir etablierte Sorten mit guten Kultureigenschaften vereint. Im Sommer zeigen sie sich wetterfest und blühen bis in den Herbst.

Topfen:

Topfen zwischen KW 4 – 10
Ampel: KW 4 – 8 (3 Pflanzen/Ampel)
T 11 – T13

Verkauf:

- Ab Anfang Mai

Substrat:

- T-Substrat
- pH 5,5 - 6,5

Düngung:

Mittlerer Nährstoffbedarf: bei kontinuierlicher Bewässerungsdüngung 0,05 % bis 0,08 % bzw. wöchentliche Flüssigdüngung mit 0,1 % bis 0,2 %.

Temperatur:

Mittlerer Wärmebedarf; nach der Einwurzelung bei TMT 18°C empfiehlt sich die Weiterkultur bei TMT 16°C. Abweichungen sind bei entsprechenden Kulturmaßnahmen möglich.

Licht:

Unter mitteleuropäischen Bedingungen nach der Einwurzelungszeit bei vollem Licht kultivieren. Achtung: Stauchen und volle Sonne kann Blattverbrennungen verursachen.

Blüte:

Ab Anfang Mai. Fakultative Kurztagspflanze. Zusatzbelichtung zur Blütenverfrühung möglich

Wachstumsregulatoren:

Empfohlen: CCC 500 – 720 ppm.

Stutzen:

Weiches Entspitzen 6- 7 Tage nach Einwurzelung.

Krankheiten/Schädlinge:

Anfällig Botrytis, Thrips and Fusarium. Achtung: Thripse übertragen Viren. Trockene Kulturführung zur Vermeidung von Wurzelerkrankungen

Flächenbelegung:

25 Töpfe / qm